

NaturTjek


Per Spleth, SEGES

psp@seges.dk



Hvad oplever naturplejer/dyreholder som barrierer vedr. kvæget?

- Lav tilvækst på græssende dyr og ingen tilskudsfodring
- Parasitter – især leverikter
- Øremærkning af kalve kan være en udfordring
- Ønske om helårsafgræsning og udegående dyr
- Økonomi i vinterfoder og evt. staldbyggeri
- Afsætning af kød til den rigtige pris



Udfordringer ved dyr i naturplejen

- Regler for udegående dyr
- Behov for god tilvækst?
- Behov for tilskuds fodring
- Økonomi i naturplejen – afsætning af slagtedyr
- Godt management af dyr i naturplejen



Helårsgræssende kvæg | udfordringer

- Kvæg skal være forberedt på at gå ude og ingen skab og lus
- Være i godt huld og tildeles foder efter behov
- Adgang til vand – også ved frostvejr
- Adgang til læ, tørt leje og ly

<https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx>

Hvad arbejder vi for?

- SEGES og L&F arbejder for, at der igen bliver forskel på racer vedr. udegående kvæg om vinteren.
- Vi ønsker, at robuste racer som GALLOWAY, HØJLANDS KVÆG, ANGUS, HEREFORD og BISON kan gå ude om vinteren med passende huld, læ, tørt leje, vand og foder efter behov.
- Vi kigger også på Sverige, hvor de har mulighed for at få forhåndsgodkendt forhold til udegående kvæg.

Barrierer ved naturpleje

- Registrering af kalve inden syv dage og øremærkning inden 20 dage
- Det kan være svært at mærke kalve, der fødes ude på store arealer
- Det kan være nemmere at gøre, når de er seks mdr. i forbindelse med fravænning
- Dispensationsmulighed
- Min. 40 Ha naturareal og max. 0,5 St kreatur/Ha

<https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Naturkalve.aspx>

God tilvækst og behov for tilskuds fodring | godt management

- Naturpleje eller kødproduktion? Eller begge dele?
- Når man laver naturpleje, kan det være svært at holde en høj tilvækst, da foderkvalitet normalt er lavere her end på sædskifte græs.
- Nogle vælger at lade køer kælve i oktober-november efter græssæson og kun lave naturpleje om sommeren med goldkøer, da de har et mindre energibehov.
- Hvis kalve fødes i marts-april, kan der være større behov for tilskud af foder om sommeren.
- Husk at det altid er tilladt at tildele mineraler/bolus.
- Hvis der er parasitter (leverikter, lungeorm) kan en del undgås ved foldskifte og ellers behandling efter behov.

Det er vigtigt at lægge den rette strategi i forhold til arealer.