

## Vejledning til statistikken

De danske klovbeskærere registrerer hvert år over en halv million beskæringer. Ved hver beskæring kan klovbeskæreren have fundet en eller flere klovlidelser. En registreret klovlidelse indgår kun i tallene, hvis der samme dag på samme dyr også er registreret en klovbeskæring. Hvis samme klovlidelse er registreret flere gange samme dag på samme dyr, vil klovlidelsen kun tælle med én gang.

Tallene i oversigten er gennemsnitstal. Hvis du bruger disse gennemsnitstal til at vurdere klovsundheden i en konkret besætning, er det vigtigt, at du kender betydningen af beskæringsstrategi, årstidsvariation med mere og inddrager den viden i din endelige vurdering af besætningen.

### **Sådan gør du**

Vælg den periode, du vil kigge på, under den grønne bjælke med overskriften '*Valgt periode xx-xx-xxxx til xx-xx-xxxx.*' Du kan gå tilbage i tiden ved at klikke på '*Forrige måned*' / '*Forrige år*' i tabellens venstre side. Tilsvarende kan du i tabellens højre side klikke dig fremad i tid.

Der er to tabeller. Den øverste viser klovbeskæringer for en 12 måneders periode'. Scrol ned for at se en tilsvarende tabel med tal for en enkelt måned. Den måned, der vises, er den seneste måned i den valgte periode.

Lidelserne er i tabellerne opdelt i fire grupper

- Haltheds- / Hasescoringer
- Hudrelaterede lidelser
- Hornrelaterede lidelser
- **Abnorme klovformer**

På [www.sundklov.dk](http://www.sundklov.dk) kan du læse om -, og se billeder af de enkelte klovlidelser. Her kan du også læse om klovbeskæring og registrering samt downloade forskellige klovværktøjer til håndtering af klovsundheden.